

CHU NICE	N° Ord. :
<b>ASTELLAS ZOLBE VYLOY</b>	
Né le 01/01/1950 - IPP :	
Service : SIMU CENTER / Dr MEDECIN	
<b>ZOLBETUXIMAB AAP 1000 mg</b>	
NaCl 0,9 % (Vol. : 500 mL)	
Intraveineuse sur 2 H	
A administrer le : J1 le jj/mm/aaaa à ....	
Pérempl. le jj/mm/aaaa à .... Conservation à 4°C	
Liste I - RESPECTER LES DOSES PRESCRITES	

CHU NICE	N° Ord. :
<b>ASTELLAS ZOLBE VYLOY</b>	
Né le 01/01/1950 - IPP :	
Service : SIMU CENTER / Dr MEDECIN	
<b>ZOLBETUXIMAB AAP 1000 mg</b>	
NaCl 0,9 % (Vol. : 500 mL)	
Intraveineuse sur 2 H	
A administrer le : J1 le jj/mm/aaaa à ....	
Pérempl. Le jj/mm/aaaa à .... Conservation à 4°C	
Liste I - RESPECTER LES DOSES PRESCRITES	

CHU NICE	N° Ord. :
<b>ASTELLAS ZOLBE VYLOY - IPP :</b>	
Serv. : SIMU CENTER - Adm. le : jj/mm/aaaa à ....	
<b>ZOLBETUXIMAB AAP 1000 mg</b>	
NaCl 0,9 % (Vol. : 500 mL) en IV	
Pérempl. le jj/mm/aaaa à .... / à 4°C	

CHU NICE	N° Ord. :
<b>ASTELLAS ZOLBE VYLOY - IPP :</b>	
Serv. : SIMU CENTER - Adm. le : jj/mm/aaaa à ....	
<b>ZOLBETUXIMAB AAP 1000 mg</b>	
NaCl 0,9 % (Vol. : 500 mL) en IV	
Pérempl. le jj/mm/aaaa à .... / à 4°C	

<b>CHU NICE</b>	<b>FICHE DE FABRICATION</b>		UF : <b>0007 SIMU CENTER</b>
Reconstitution le jj/mm/aaaa à ....	N° ordonnancier :		Prescripteur : MEDECIN
<b>ASTELLAS ZOLBE VYLOY IPP :</b> (né le 01/01/1950)			
Poids : 37 kg - Taille : 149 cm - S.C. : 1.25 m <sup>2</sup> - Crétat. : 0 µmol/L			
Protocole : ZOLBETUXIMAB - FOLFOX CYCLE 1 Dose de charge unique			
Administration du C1 J1 le jj/mm/aaaa à ....			
Voie d'administration : Intraveineuse			
<b>ZOLBETUXIMAB AAP 1 000.00 mg</b>			
NaCl 0,9% 500 ML poche			
Volume : 500.00 mL			

Spécialité	Dosage	Nb	Vol. (mL)	Solvant	Vol à prélever (mL)	Dose (mg)	Numéro lot
VYLOY 100 mg poudre	100,00	10	5,00	Eau P.P. I.	50 mL (Totalité)	1 000,00	
Stab : jj/mm/aaaa à .... T° amb. abri lum.	V. Tot.	50,00		Total	<b>50,00 mL</b>	1 000.00 mg	

Dispositif :	Vol. à retirer : 50.00 mL N° lot :
Véhicule utilisé : NaCl 0,9% 500 ML poche	Vol. à prélever : 50.00 mL Pérempl.
Volume Final : 500.00 mL à 2.00 mg/mL	

Val. Pharm. : Pharmacien	Val. Fiche : Pharmacien	Manip. : PPH
<p>Mode opératoire :</p> <p>- ZOLBETUXIMAB :</p> <p>Reconstitution du flacon unidose :</p> <p>1/ Reconstituer le flacon en ajoutant lentement 5 mL d'eau pour préparations injectables (EPPI). Diriger le jet d'EPPI le long des parois du flacon.</p> <p>2/ Remuer délicatement chaque flacon jusqu'à dissolution complète. La solution reconstituée contient 20 mg/mL de zolbétuximab.</p> <p>Dilution dans une poche de perfusion :</p> <p>1/ Vider ou ajouter à la poche un vol X de NaCl 0,9% montée d'une tubulure d'extension avec un filtre de 0,2µm ; la concentration finale de la poche étant de 2 mg/ml</p> <p>2/ Prélever la dose calculée de solution reconstituée du ou des flacon(s) et la transférer dans une poche de perfusion.</p> <p>3/ Diluer dans la poche pour perfusion de NaCl (0,9%).</p>	<p>Matériel nécessaire :</p> <p>NaCl 0,9% 500 ML poche</p> <p>Seringue 5 ml</p> <p>Eau PPI</p> <p>Aiguille 18G</p> <p>Tubulure d'extension avec filtre 0,2 µm</p> <p>Seringue 60 ml</p>	