

Protocole : **ZOLBETUXIMAB - FOLFOX CYCLE 1 Dose de charge unique**

Jour 1 - Jour de validation médicale									
D.C.I. et Produit	Dose / J	Nb J	Voie	Durée	Chrono	D. max / pr	Vol. prot.	Solvant	Commentaire
NACL 0.9%	100 mL	1	PERF	1h00	- 01H00		0.00 mL		Branchement de la perfusion
ANTIEMETIQUE	mg	1	IVL	0h05	- 00H30		0.00 mL		Prémédication
ZOLBETUXIMAB AAP	800 mg/m ²	1	IV	2h00	00H00		0.00 mL	NaCl 0,9% 500 ML poche	Commencer la perfusion à un débit de 75mg/m ² /h pendant 30 à 60 min En fonction de la tolérance, augmenter progressivement le débit de perfusion entre 150-300 mg/m ² /h .
NACL 0.9%	50 mL	1	IV	0h10	02H00		0.00 mL		Rinçage
CORTICOIDE	mg	1	IVL	0h02	02H05		0.00 mL		Prémédication
OXALIPLATINE	85 mg/m ²	1	IV	2h00	02H10		0.00 mL	GLUCOSE 5% 250 ML poche	En Y avec l'acide folinique.
AC FOLINIQUE	400 mg/m ²	1	IV	2h00	02H10		0.00 mL		En Y avec l'oxaliplatine
GLUCOSE 5%	50 mL	1	PERF	0h10	04H10		0.00 mL		Rinçage
5 FLUORO-URACILE	400 mg/m ²	1	IV	0h15	04H20		0.00 mL	GLUCOSE 5% 100 ML poche	En bolus En cas de 1ère administration, vérifier l'uracilémie.
GLUCOSE 5%	50 mL	1	PERF	0h10	04H35		0.00 mL		Rinçage
5 FLUORO-URACILE	1200 mg/m ²	2	INF	46h00	04H45		110.00 mL	Poche 46h pour pompe Rythmic Glucose 5%	En cas de 1ère administration, vérifier l'uracilémie.

EXAMPLE

EXAMPLE

EXAMPLE